



**PROGRAMA FITOSANITARIO
2026/27
Ciruelo Europeo
Comité Técnico Chileprunes A.G.**





PROGRAMA FITOSANITARIO 2026/27

Ciruelo Europeo Comité Técnico Chileprunes A.G.

Este programa fitosanitario fue desarrollado por el comité técnico de Chileprunes A.G. (Asociación de Procesadores y Exportadores de Ciruelas Secas de Chile) y es resultado del estudio de las regulaciones de productos fitosanitarios en los mercados a los cuales nuestra ciruela es destinada. Este programa cumple con las regulaciones de los principales mercados de destino vigentes a la fecha de su elaboración. En las observaciones se indica aquellos casos en que debe prestarse atención a alguna regulación en particular, no obstante **no exime de responsabilidad al productor en la correcta aplicación de los productos**, del respeto de las indicaciones de etiquetas correspondientes incluyendo entre otros la forma de aplicación, mantención y calibración de la maquinaria agrícola, revisión de vigencias de autorización del registro SAG y cumplimiento con los Límites Máximos de Residuos (LMR) de los países de destino de los productos, entre otros.

Este programa y los productos aquí mencionados son sólo una sugerencia y exime a Chileprunes A.G. de toda responsabilidad de uso e implementación.

En la página web del SAG (<https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/listado-de-plaguicidas-autorizados-prohibidos-restringidos-y-cancelados-etiquetas-y-hds>), usted podrá encontrar el listado de productos autorizados y restringidos para la aplicación en ciruelos. Respecto a la clasificación toxicológica en abejas, revisar constantemente nueva información en <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMTA4ZDRjOWItODE3Yy00NjZiLTg3Y2ltZTgzY2QxY2M4YWQ1liwidCI6Ijc3ZWVhY2Y1LTU4NjQ0NDIyYS1hNTM1LTZiYTQ3MTU0MDI5YyIsImMiOiR9> así como en la etiqueta actualizada del plaguicida al momento del uso.



PROGRAMA FITOSANITARIO 2026/2027

A continuación, encontrará la propuesta de programa fitosanitario revisado según información de etiquetas vigentes al 22/06/2026. En ella, considere que los colores de columna central asociados a la categoría de toxicidad de la etiqueta, acorde a la Clasificación de los Plaguicidas según Riesgos, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Chileprunes recuerda al usuario que **debe respetar las indicaciones contenidas en las etiquetas correspondientes de cada producto autorizado**, así como realizar los avisos correspondientes a vecinos, autoridades y/o apicultores según normativas vigentes al momento y vía de aplicación. Se debe evitar aplicaciones en horario de vuelo de las abejas, en especial en el período de floración.

Igualmente debe respetar las carencias locales y aquellas fijadas para cumplir con los LMR en destino de la fruta.

Si bien se presentan distintas alternativas en una misma oportunidad de uso, Chileprunes ha realizado un esfuerzo técnico reflexivo en el diseño de esta propuesta, a fin de promover la disminución de uso de plaguicidas de mayor impacto contra las abejas y el medio ambiente. Se recuerda a los usuarios que, desde enero 2026 entraron en vigor los avisajes obligatorios (entre otras nuevas obligaciones vinculadas al uso de plaguicidas) incluidas en la resolución exenta 7068/2025 del Servicio Agrícola y Ganadero, sobre las cuales, se ha incluido en este programa la información de categoría vigente de toxicidad a abejas actualizada al 22/06/2026, lo cual debe ser corroborado al momento de planificar la aplicación. Acorde a dicha resolución, el uso de **Plaguicidas clasificados como “altamente tóxicos” y “moderadamente tóxicos” contra abejas** debe ser avisado a apicultores vecinos. **Chileprunes sugiere que, mientras se encuentren algunos plaguicidas bajo el proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas; éstos también sean avisados respecto a su uso de manera preventiva.**



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Receso-poda	Plateado (<i>Chondostereum purpureum</i>); Chancro (<i>Cytospora chrysosperma</i>) Inóculo: Pudrición negra del cerezo (<i>Alternaria alternata</i>); Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	<i>Bionectria ochroleuca, Trichoderma gamsii, Hypocrea virens</i>	Mamull®	2964-O	100 g	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Para tratamiento de cortes de poda o heridas, asperjar utilizando Vol. Agua/ha: 500-1.000 L, según tamaño de planta. Para tratamiento de hojarasca, se recomienda una concentración de 100 g/hL en 400 L/ha de agua (desde caída de hojas hasta floración).	Fungicida
			O				
	Plateado (<i>Chondrostereum purpureum</i>); Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>); Chancro del cerezo (<i>Cytospora leucostoma</i>); Agalla de la corona (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	<i>Bionectria ochroleuca, Bacillus licheniformis, Hypocrea virens</i>	Coraza®	2938-O	--	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. La formulación corresponde a una PASTA (PA). Pintar inmediatamente realizado el corte. Esta recomendación es útil durante la implementación del cambio de sistema de tratamiento post-poda (seguridad del usuario). Posteriormente continuar exclusivamente con productos.	Fungicida-Bactericida
			O				
	Botryosphaeria (<i>Diplodia seriata</i> /Neofusicoccum australe)	<i>Trichoderma atroviride</i> Cepa MUCL45632	Tifi® Polvo	2708-O	1,0-2,0 kg/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Aplicar directamente a los cortes de poda, heridas y daños mecánicos hasta 72 horas después de realizados , no hay restricciones de número de aplicaciones por temporada. Dejar transcurrir 10 días entre aplicaciones con fungicidas. Evitar todo tipo de escurrimiento fuera del área de corte tratada.	Fungicida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Receso	Escama de San José (Diaspidiotus perniciosus), Conchuela blanda marrón de la vid (Coccus hesperidum), Conchuela café (Parthenolecanium persicae), Chanchito blanco (Pseudococcus calceolariae; P. viburni; P. longispinus); Corineo o tiro de munición (Wilsonomyces carpophilus), Cloca del duraznero (Taphrina deformans), Oídio del ciruelo (Podosphaera tridactyla = P. oxyacanthae var. tridactyla = P. oxyacanthae)	Polisulfuro de calcio	Polisul® 35	2429-O	6,5 L/100L	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar durante pleno receso invernal, de manera temprana después de caída de hojas y hasta el estado latente tardío previo a la ruptura de yemas. Utilizar un volumen de mojamiento de 1.000 litros de agua/ha, asegurando una buena calidad de cobertura. Una única aplicación por temporada.	Insecticida-Fungicida-bactericida-acaricida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Receso invernal	Cloca, corineo, Cáncer Bacterial	Óxido Cuproso	Nordox® Super 75 WG	2470-O	130-200 gr	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Prevención del cáncer bacterial: 1ª aplicación con 5-10% de caída de hojas; la 2ª con 70-80% de caída de hojas y la 3ª con 100% de caída de hojas y/o yema hinchada. Para prevención de cloca y corineo, (tiro de munición): aplicar a caída de hojas y al inicio de hinchazón de yemas. Máximo cinco (5) aplicaciones / temporada.	Fungicida-Bactericida
			o				
	Cáncer Bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>) Corineo (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)		Cuprodul® 75 Super	2647	130-200 gr	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Para controlar las 3 enfermedades, efectuar la aplicación en estado de yema hinchada. La selección de la dosis dependerá de la presión de infección reportada en cada predio. La dosis por 100L de agua, está referida a un mojamiento de 1.500 L de agua por hectárea. Debido a que es ligeramente toxico para las abejas , se recomienda NO APLICAR EN FLORACIÓN Y RETIRAR COLMENAS durante su aplicación.	
			o				
	Cancer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>), Tiro de munición (<i>Corineum beijerinckii</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>)		Cuprodul® WG	2185-O	200-300 gr	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar en otoño cuando haya caído el 50% de las hojas. Para control de cloca repetir en yema hinchada. En todos los cultivos, salvo aquellos en donde se dan indicaciones específicas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, aplicar un máximo de 4 veces en la temporada, repitiendo cada 10-15 días, con un mojamiento de 1.500-2.000 L/ ha.	
			o				
	Cáncer bacterial, Tiro de munición y Cloca		Cobre Premium®	2560-O	200-300 gr	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar en otoño cuando haya caído el 50% de las hojas. Para control de cloca y tiro de munición, repetir en yema hinchada. Utilizar la dosis mayor en condiciones de media a alta presión de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua de hasta 2.000 L/ha que permita un adecuado cubrimiento de los árboles.	
			o				



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Receso invernal	Cáncer bacteriano (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	Hidróxido de Cobre	Champ® DP	2490-O	200-300 gr	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar durante la caída de las hojas en otoño. Se sugiere a lo menos, tres aplicaciones cuando hayan caído aproximadamente 10, 50 y 80% de las hojas. Bajo alta presión de la enfermedad, se sugiere aplicar en yema hinchada, previo a la brotación y durante la caída de las hojas, a su vez se recomienda aplicar con una frecuencia entre 15 a 21 días dependiendo de la intensidad y frecuencia de lluvias que ocurran en otoño e invierno. Aplicar hasta 5 veces durante la temporada. Mojamiento 1.500 a 2.000 L/ha	Fungicida-Bactericida
			O				
	Cáncer bacteriano (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)		Kocide® 2000	2717	200-300 gr	Ligeramente tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar en otoño, cuando hayan caído aproximadamente un 10%, un 50% y un 80% a 100% de las hojas. Bajo alta presión de la enfermedad, aplicar en yema hinchada, previo a la brotación. Volumen de agua: 1.500 - 2.000 L/ha. Máximo 6 aplicaciones por temporada.	
			O				



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Receso invernal	Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	<i>Bacillus subtilis</i> Cepa Antumávida / <i>Bacillus subtilis</i> Cepa Vilcún / <i>Bacillus licheniformis</i> Cepa Mallerauco / <i>Brevibacillus brevis</i> Cepa Maguellines / <i>Brevibacillus brevis</i> Cepa Maguellines I	Nacillus®	2678-O	150 g	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Cepas bacterianas adaptadas a condiciones de bajas temperaturas. Vol. de agua recomendado para periodo de receso (BBCH 97 a BBCH 00): 1.000-1.500 L/ha. Nacillus® puede reemplazar aplicaciones de cobre invernales, de caída de hoja e inmediatamente postcosecha (control de cáncer bacterial). No aplicar en mezcla con cobres ni antibióticos, como tampoco inmediatamente de realizados estos tratamientos. No aplicar en presencia de residuos de polisulfuro de calcio (polisulfuro es altamente tóxico para los trabajadores y la microbiota benéfica del huerto).	Bactericida
		o					
	Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	Sulfato de cobre pentahidratado	Mastercop®	2545-O	1,0 - 1,5 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Iniciar las aplicaciones en caída de hojas en otoño, repitiendo la aplicación en floración cada 10 - 12 días, especialmente después de la ocurrencia de heladas. Cuatro (4) aplicaciones por temporada, mojando con 1.000 a 1.500 L/ha.	Fungicida-Bactericida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	Nº autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Receso invernol			o				
	Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	Sulfato de cobre pentahidratado	Biocopper 56®	2660	0,75 a 1,25 L/ha	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar en otoño previo y durante caída de hojas 1 a 4 veces, yema hinchada: 1 a 4 veces y poda de limpieza: 1 a 4 veces	Fungicida-Bactericida
			o				
	Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)		Agrocopper® SP	2833-O	60 g	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Tratamiento otoño-invierno: Realizar 3 aplicaciones en caída de hoja, receso invernol y yema hinchada, con mojamiento de 1.500 L de agua / hectárea.	



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
	Chanchitos blancos- Escama de San José (Diaspidiotus perniciosus)*. También autorizado para: Escama blanca (Aspidotus nerii), Conchuelas café (Parthenolecanium persicae), Conchuela café europea (Parthenolecanium corni), Polilla oriental (Cydia molesta), Polilla de la manzana (Cydia pomonella), Pulgón verde (Myzus persicae), Trips (Frankliniella occidentalis).	Diazinon	Diazol® 50 EW*	1591	100 cc/100L	Muy tóxico contra abejas, requiere avisaje. Para control de escama de San José y chanchito blanco, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de ninfas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días, utilizando un volumen de aplicación de 2.000 L de agua/ha. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión de plagas. DIAZOL® 50 EW es un insecticida organofosforado con acción de contacto, ingestión e inhalación.	Insecticida
Yema hinchada	Aplicación Salida de Invierno: Escama de San José (Diaspidiotus perniciosus)	Piriproxifen	ó Admiral 10 EC	1787	50-70 cc/100 L agua (1,0-1,50 L/ha)	Virtualmente no tóxico a abejas. *En caso de contar con monitoreo que permita establecer el porcentaje de estados juveniles susceptibles a muda expuestos especialmente en ramas y ramillas, para el control de escama de San José se considera como opción el uso de otros productos de alta especificidad en su mecanismo de acción, en este caso, reguladores de crecimiento de insectos como corresponde el ingrediente activo piriproxifen (acción de contacto)	Insecticida
			ó Delico 100 EC	1821			
			ó Galactic	1871			
	Huevos de Araña Roja	Aceite Parafínico	Pure® Spray 22 E	1791	0,7 L/100L	Muy tóxico contra abejas, requiere avisaje. Estados móviles de arañas roja europea (Panonychus ulmi) Primavera-verano	Insecticida-acaricida-fungicida
			o				
			Citroliv® emulsible	1368-O	2-2,5 L	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Salidas de invierno	Insecticida-acaricida
			o				



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Yema hinchada	Huevos de Arañita Roja	Aceite Parafínico	Winspray®	1768	2 L	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Salidas de invierno	Insecticida- acaricida
			o				
			Ultraspray®	1630	2 L	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Salidas de invierno hasta botón verde	Insecticida- acaricida
En inicio de desarrollo de frutos al detectar primeros ejemplares	Pulgón verde	Afidopiropeno	Versys®	1900	150 cc/ha	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar al aparecer los primeros ejemplares y repetir a los 15 días en caso de ser necesario. Se recomienda utilizar un volumen de agua entre 1.000 a 2.000 L/ha, para carozos en pleno desarrollo o el volumen suficiente para asegurar un buen cubrimiento del follaje y ramillas. Aplicar máximo 2 veces durante el cultivo, alternando con insecticidas de diferente modo de acción. Prefiera la dosis mayor para condiciones de alta presión de la plaga. No aplicar más de 150 cc/ha.	Insecticida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Botón Floral a inicio de flor	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>); Monilia (<i>Monilia laxa</i>)	Tebuconazole	Odin® 43 SC	2696	30-40 cc.	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar en botón y plena floración. Mojamiento: 1500 L/ha. Evite mezclar con productos piretroides de formulación Emulsión Concentrada. No mezclar con coadyuvantes organosiliconados.	Fungicida
			o				
	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>); Botritis o Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)		Orius® 43 SC	2533	30-40 cc.	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Realizar dos aplicaciones desde botón floral a caída de pétalos, con intervalos de 8-10 días, según condiciones de infección. Mojamiento 1.000-1.200 L/há. Utilizar dosis mayor frente a mayor grado o condiciones de infección imperantes al momento de la aplicación.	Fungicida
			o				
	Moho Gris <i>Botrytis cinerea</i> , Tizón de la Flor, Moniliasis <i>Monilia laxa</i>		Tebuconazol 43 SC Solchem®	2769	30-40 cc.	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Aplicación: Para Botritis y Monilia, aplicar en botón y plena flor. Mojamiento: Utilizar volúmenes de agua de 1500 a 1800 L/ha. Frecuencia: Aplicar como máximo 2 veces en la temporada cada 15 días.	Fungicida
			o				



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Botón Floral a inicio de flor	Tizón de la Flor, Moho Gris o Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Moniliasis (<i>Monilia laxa</i>), Pudrición parda o morena de los carozos (<i>Monilinia fructicola</i>)	Tebuconazole	Vertice® 43 SC	2763	30-40 cc.	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Dosis 0,5 L/ha. Para Botritis y Monilia, aplicar en botón y en plena flor.	Fungicida
			o				
	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia laxa</i>)		Apolo® 430 SC	2916	30-40 cc.	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Aplicar desde botón floral hasta caída de pétalos. Volumen de agua 1.500 L/ha. Aplicar máximo dos (2) veces por temporada con un intervalo de 8 a 10 días	Fungicida
			o				
	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>); Botritis o Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)		Atlas® 43 SC	2835	30-40 cc.	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Realizar hasta 2 aplicaciones desde botón floral hasta caída de pétalos, con intervalos de 8-10 días o según condiciones de infección. Mojamiento: 1.000-1.200 L/há. Utilizar la dosis mayor frente a mayor grado o condiciones de infección imperantes al momento de la aplicación.	Fungicida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	Nº autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Botón Floral a inicio de flor			o				
	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tiro de munición (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	Captan	Captan® Prime 80 WG	2.000-0017	180 g	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar en forma preventiva desde botón floral, repitiendo cada 8-10 días o según condiciones de infección. Máximo de aplicaciones por temporada: 2. No aplicar con altas temperaturas (mayores a 25°C) Volumen de mojamiento recomendado: 1.500-2.000 L/ha. No aplicar en mezcla con aceites y/o surfactantes. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones realizadas con aceites. No mezclar con formulaciones de plaguicidas de concentrados emulsionables (EC).	Fungicida
			o				
	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tiro de munición (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)		Captan® Gold 80 WG	2475	180 grs.	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Realizar hasta 2 aplicaciones en forma preventiva desde botón floral, con un intervalo de 8 a 10 días o según condiciones de infección. Mojamiento 1.500 a 2.000 L/ha. CAPTAN GOLD 80 WG puede producir daños en peras D'anjou y Bosc, en manzanas Red Delicious y Winesap, por lo que se debe tener máxima precaución con el efecto deriva. No aplicar en mezcla con aceites y/o surfactantes. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones realizadas con aceites. No mezclar con formulaciones de plaguicidas de concentrados emulsionables (EC).	
			o				
	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tiro de munición (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)		Captan® 83 WP	2014	180 grs.	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Realizar hasta dos aplicaciones en forma preventiva desde botón floral, con un intervalo de 8 - 10 días o según condiciones de infección. Mojamiento 1.500 L/ha.	



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	Nº autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Floración	Monilia (<i>Monilia laxa</i> , <i>M. fructicola</i>); Cladosporium (<i>Cladosporium</i> spp.); Tiro de munición (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	Clorotalonilo	Clorothalonil 720 SC	2870	125 cc	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar desde inicio de flor, con un mojamiento de 1.500 - 2.000 L por hectárea, dependiendo del estado vegetativo de las plantas. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por temporada, con intervalos de 7 a 10 días, intercalando con productos de distinto modo de acción. Se recomienda no aplicar Point Clorotalonil 720 SC en mezcla con surfactantes, fertilizantes foliares, aceites agrícolas, emulsiones y agentes tensoactivos, para evitar posibles efectos fitotóxicos. Esperar 10 días desde la última aplicación de aceite antes de hacer una aplicación de Point Clorotalonil 720 SC.	Fungicida
			o				
	Monilia (<i>Monilia laxa</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Cloca (<i>Taphira deformans</i>) y Corineo (<i>Wisonomyces carpophilus</i>)	Clorotalonilo	Pugil® 720	2801	125 cc	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Dosis mínima 1,9 – 2,7 L/ha. Aplicar en inicio de flor, con un mojamiento de 1.500 – 2.000 L/ha. Para volúmenes mayores de agua, respetar la dosis por concentración. Repetir en caída de pétalos. Máximo de aplicaciones por temporada: 2. Dosis mayor con alta presión de las enfermedades. No utilice PUGIL 720 en combinación con aceites minerales, fertilizantes foliares u otros plaguicidas emulsionables. No agregue surfactantes o agentes tensoactivos a la aplicación de PUGIL 720.	
			o				
	Monilia o Tizón de la flor	Fenbuconazol	Indar® 2F	2257	20 - 30 cc	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar desde botón rosado a plena flor. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada en ciruelos.	
	Botrytis				50 - 75 cc		



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Plena Flor	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tiro de munición (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	Captan	Captan® Prime 80 WG	20017	180 g	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar en forma preventiva desde botón floral, repitiendo cada 8-10 días o según condiciones de infección. N° máximo de aplicaciones por temporada: 2. No aplicar con altas temperaturas (mayores a 25°C). Volumen de mojamiento recomendado: 1.500-2.000 L/ha. No aplicar en mezcla con aceites y/o surfactantes. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones realizadas con aceites. No mezclar con formulaciones de plaguicidas de concentrados emulsionables (EC).	Fungicida
			o				
	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>), Cloca (<i>Taphrina deformans</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tiro de munición (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)		Captan ® Gold 80 WG	2475	180 grs.	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Realizar hasta 2 aplicaciones en forma preventiva desde botón floral, con un intervalo de 8 a 10 días o según condiciones de infección. Mojamiento 1.500 a 2.000 L/ha. CAPTAN GOLD 80 WG puede producir daños en peras D'anjou y Bosc, en manzanas Red Delicious y Winesap, por lo que se debe tener máxima precaución con el efecto deriva. No aplicar en mezcla con aceites y/o surfactantes. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones realizadas con aceites. No mezclar con formulaciones de plaguicidas de concentrados emulsionables (EC).	



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Plena Flor	Moniliasis o Tizón de la flor (<i>Monilia laxa</i>), Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Tiro de munición (<i>Wilsonomyces carpophilus</i>)	Captan	Captan® 83 WP	2014	180 grs.	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Realizar hasta dos aplicaciones en forma preventiva desde botón floral, con un intervalo de 8 - 10 días o según condiciones de infección. Mojamiento 1.500 L/ha.	Fungicida
o			o				
Plena Flor	Tizón de la flor	Pirimetalino + tebuconazol	Dimensión® 450 SC	2930	100 cc	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Dosis mínima: 1,5 L/ha. Aplicar desde pétalos expuestos a plena flor, repitiendo en caso de ser necesario. Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje. No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes. Volumen de agua sugerido 1.000 a 1.500 L/ha	Fungicida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
			o				
Plena Flor	Tizón de la Flor (<i>Botrytis cinerea</i> ó <i>Monilia laxa</i>)	Piraclostrobin	Comet®	2463	0,5 L/ha	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Comet®, Concentrado emulsionable (EC): Dosis de 0,5 L/ha, árboles adultos. Para control de Tizón de la flor, realizar tratamientos preventivos en inicio de floración y repetir cada 7-14 días. Máximo aplicaciones por temporada: 2. Utilizar un mojado de 1.200 - 1.600 L de agua/ha.	Fungicida-Fitorregulador
			+				
	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	Pirimetanilo	Scala® 400 SC	2339	2,0 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Dosis: 2,0 L/ha. Para el control de Botritis, aplicar desde pétalos expuestos hasta inicio de cuaja (caída de pétalos) ó en Pre cosecha. Aplique en estrategia preventiva cada 7 - 10 días. Contemplar no más de dos aplicaciones durante la temporada. Considerar volumen de 1.500 L de agua/ha, privilegiando un buen cubrimiento de la superficie a tratar.	Fungicida
			o				



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Plena Flor	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	Fenhexamid	Teldor® 500 SC	2588	1,2 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. Aplicar en estadíos críticos, con condiciones predisponentes favorables para el desarrollo de la enfermedad especialmente en floración y/o pre-cosecha. Se sugiere utilizar un volumen de aplicación de 1.000 a 1.500 L de agua/ha. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada cada 10 a 14 días, alternando con fungicidas de distinto grupo químico.	Fungicida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Caída de pétalos	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	<i>Hypocrea virens</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Puelche® WP	2978-O	100-150 g	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Se recomienda aplicar Puelche® (WP) en dosis de 100 g/hl con baja presión de la enfermedad y en dosis de 150 g/hl con alta presión. Aplicar con condiciones predisponentes para la enfermedad (agua libre o síntomas de la enfermedad), desde floración en adelante. Mojamiento sugerido de 1000 l/ha, según estado fenológico y/o tamaño de plantas. Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar PUELCHÉ® (WP) con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. No usar este producto junto con agua oxigenada. Tampoco utilizar si hubo una aplicación previa de los plaguicidas descritos mientras permanecen activos en el cultivo objetivo (consultar tiempo de cobertura de los productos).	Fungicida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Floración	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición morena (<i>Monilia fructicola</i>)	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa MBI 600	Serifel® WP	2976-O	60 - 100 g	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar preventivamente desde floración hasta precosecha según presión de la enfermedad, repitiendo cada 7 a 10 días. Aplicaciones por temporada: realizar hasta 3 aplicaciones. Utilizar las dosis mayores en cultivos con alto desarrollo de follaje y/o cuando exista alta presión de la enfermedad. Mojamiento: aplicar con volúmenes de agua entre 1.000 y 1.500 L de agua/ha, según el desarrollo del cultivo asegurando siempre un cubrimiento óptimo del follaje. No mezclar con antibióticos ni cobres. No utilizar aguas cloradas para la aplicación.	Fungicida
			o				
Caída de pétalos	Monilia (<i>Monilia laxa</i> , <i>Monilia fructicola</i>), Cladosporium (<i>Cladosporium</i> spp.), Tiro de munición (<i>Coryneum beijerinckii</i>)	Clorotalonilo	Bravo® 720	2354	125 cc.	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Mínimo 2,5 L/ha. Aplicar desde caída de pétalos con intervalos de 7 a 10 días y con mojamiento mínimo de 2.000 L de agua por hectárea. El mínimo por hectárea corresponde a plantas en pleno desarrollo. Para volúmenes de agua mayores a 2.000 L/ha, respetar la dosis por concentración. En duraznero, ciruelo y cerezo aplicar sólo 1 vez en la temporada. En caso de requerir sólo controlar Monilia (<i>Monilia laxa</i>) , aplicar desde inicio de flor con intervalos de 7 a 10 días y con mojamiento mínimo de 1.500 L de agua por hectárea. En caso necesario, repetir en caída de pétalos. El mínimo por hectárea corresponde a plantas en pleno desarrollo. Para volúmenes de agua mayores a 1.500 L/ha, respetar la dosis por concentración. En duraznero, ciruelo y cerezo aplicar sólo 1 vez en la temporada.	Fungicida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Fruto recién cuajado	Araña roja europea, araña bimaclada	Spirodiclo-feno	Envidor® 240 SC	1713	50-60 cc. (0,75 a 1 L/ha)	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicación hasta noviembre. Aplicar temprano orientado al control de estados juveniles.	Acaricida
			o				
	Araña bimaclada	Bifenazato	Acramite® 480 SC	1880	50 cc (1,25 L/ha)	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. No aplicar en floración. Aplicar con gota fina. Una aplicación por año, orientada al control de estados móviles de los ácaros.	Acaricida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Fruto recién cuajado	Escama de San José (Diaspidiotus perniciosus), Chanchitos blancos (Pseudococcus viburni, P. longispinus, P.calceolariae).	Espirote-tramato	Movento® 100SC	1776	1,8-2,0 L/ha	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar con follaje suficientemente desarrollado, desde fruto cuajado en adelante, prefiriendo el control dirigido a la primera generación de las plagas. Si se aplica en estados tardíos de desarrollo de éstas no se logran los mejores resultados. Preferir la dosis alta cuando la presión de la plaga sea alta o en árboles en pleno desarrollo vegetativo. Realizar máximo 2 aplicaciones durante la temporada, con un espaciamiento de 30 días. Utilizar volúmenes de aplicación máximos de 2.000 L/ha, de acuerdo con el estado de desarrollo del cultivo, maquinaria y tipo de boquillas a utilizar	Insecticida
			+				
	Polilla oriental, Grapholita molesta (Busk) y Lobesia botrana	Clorantraniliprole	Coragen EVO	1935	7 cc	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Realizar no más de 2 aplicaciones por generación a la misma especie en el mismo cultivo, con un intervalo de 21 días, con un volumen de agua sugerido de 1500 L agua/ha. Días de protección en Lobesia botrana: 30 días según listado SAG Mayo 2026.	Insecticida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de frutos, según programa de manejo de polillas	Polilla oriental, Grapholita molesta (Busk) y Lobesia botrana	Clorrantrili-prole	Coragen EVO	1935	7 cc	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Realizar no más de 2 aplicaciones por generación a la misma especie en el mismo cultivo, con un intervalo de 21 días, con un volumen de agua sugerido de 1500 L agua/ha. Días de protección en Lobesia botrana: 30 días según listado SAG Mayo 2026.	Insecticida
			+				
En frutos de 20 mm	Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae), Trips de California (Frankliniella occidentalis), Escama de San José (Diaspidiotus perniciosus), Chanchito blanco (Pseudococcus viburni, Pseudococcus calceolariae)	Flupiradifurona	Sivanto® Prime	1887	0,75 L/ha	Ligeramente tóxico a abejas. No requiere avisaje. Para pulgones, aplicar temprano en la temporada, cuando aparecen los primeros ejemplares ápteros durante el período de floración, desde botón foral a plena flor (BBCH52 a BBCH65). Para trips, escama de San José y chanchito blanco aplicar temprano en la temporada, desde floración (BBCH 57) a fruto 20 mm (BBCH 72). Utilizar volúmenes de aplicación adecuados de acuerdo al tamaño de las plantas y estado fenológico, utilizando el menor volumen que permita un buen cubrimiento de la planta. Se sugiere un volumen de aplicación máximo de 1.800 L/ha. Realizar máximo 1 aplicación por temporada.	Insecticida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de frutos, según programa de manejo de polillas	Polilla oriental y <i>Lobesia botrana</i>	Espinetoram	Delegate	1779	15 g	Muy tóxico a abejas. Requiere avisaje. Aplicar a 21 días desde Coragen Evo (Por intervalo entre aplicaciones de Cydia molesta). Máximo 4 aplicaciones por temporada, de ellas, máximo 2 aplicaciones consecutivas. 21 días de protección en listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026", mismos días en polilla oriental.	Insecticida
Desarrollo de frutos, según programa de manejo de polillas	Polilla oriental, Grapholita molesta (Busk) y <i>Lobesia botrana</i>	Clorantraniliprole	Coragen EVO	1935	7 cc	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar a 21 días desde Delegate (Considerando período de protección de Delegate). Volumen de agua sugerido de 1500 L agua/ ha. Días de protección en Lobesia botrana: 30 días según listado SAG Mayo 2026.	Insecticida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de fruto	Polilla oriental; trips de california, escama de San José y pulgón verde y <i>Lobesia botrana</i>	Acetamiprid	Predator®	1838	45 cc	Moderadamente tóxico a abejas. Requiere avisaje. Aplicar según período de protección del producto anterior utilizado. 14 días de protección en <i>L. botrana</i> según listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Máximo 2 aplicaciones por temporada.	Insecticida
			o				
	Polilla oriental; trips de california, escama de San José y pulgón verde y <i>Lobesia botrana</i>		Quilate® 225 SL	1907	45 cc	Ligeramente tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar según período de protección del producto anterior utilizado. 14 días de protección en <i>L. botrana</i> según listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Aplicar según muestreo de la plaga. Utilizar un mojamiento de 2.000 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico. Hacer máximo de 2 aplicaciones por temporada con intervalo de 15 días.	

*Plaga bajo control oficial



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de frutos	Polilla oriental, Grapholita molesta (Busk) y Lobesia botrana	clorantraniliprole	Coragen EVO	1935	7 cc	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Realizar no más de 2 aplicaciones por generación a la misma especie en el mismo cultivo, con un intervalo de 21 días, con un volumen de agua sugerido de 1500 L agua/ha. Días de protección en Lobesia botrana: 30 días según listado SAG Mayo 2026.	Insecticida
Acorde a protección de producto anterior	Polilla oriental, y Lobesia botrana	Lambda cyhalotrina	Karathe con Tecnología Zeon	1761	20cc	Muy tóxico a abejas. Requiere avisaje. 18 días de protección en listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Hasta 4 veces durante la temporada, desde brotación hasta precosecha.	Insecticida
	Polilla oriental, y Lobesia botrana		Invicto 050 CS	1833	20 cc	Ligeramente tóxico a abejas. No requiere avisaje. 18 días de protección en listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Hasta 2 veces durante la temporada, desde brotación hasta precosecha. Volumen de agua recomendado: 1500 L/ha	
	Polilla oriental, y Lobesia botrana		Ninja	1799	20 cc (mínimo 150 cc/ha)	Muy tóxico a abejas. Requiere avisaje. 18 días de protección en listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Hasta 4 veces durante la temporada, desde brotación hasta precosecha.	
	Polilla oriental, y Lobesia botrana		Trinica CS	1930	4cc (mínimo 30 cc/ha)	Muy tóxico a abejas. Requiere avisaje. 18 días de protección en listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Hasta 3 veces durante la temporada, desde brotación hasta precosecha.	



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de frutos	Polilla oriental, Grapholita molesta (Busk) y Lobesia botrana	Clorrantrani-prole	Coragen EVO	1935	7 cc	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Realizar no más de 2 aplicaciones por generación a la misma especie en el mismo cultivo, con un intervalo de 21 días, con un volumen de agua sugerido de 1500 L agua/ha. Días de protección en Lobesia botrana: 30 días según listado SAG Mayo 2026.	Insecticida
	Polilla oriental; trips de california, escama de San José y pulgón verde y Lobesia botrana	Acetamiprid	Predator®	1838	45 cc	Moderadamente tóxico a abejas. Requiere avisaje. Aplicar según período de protección del producto anterior utilizado. 14 días de protección en L. botrana según listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Máximo 2 aplicaciones por temporada.	
			o				
	Polilla oriental; trips de california, escama de San José y pulgón verde y Lobesia botrana	Acetamiprid	Quilate® 225 SL	1907	45 cc	Ligeramente tóxico a abejas. No requiere avisaje. Aplicar según período de protección del producto anterior utilizado. 14 días de protección en L. botrana según listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Aplicar según muestreo de la plaga. Utilizar un mojado de 2.000 L de agua/ha, dependiendo del estado fenológico. Hacer máximo de 2 aplicaciones por temporada con intervalo de 15 días.	



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de frutos	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición ácida (<i>Geotrichum candidum</i>)	Hidrógeno carbonato de potasio	Kaligreen Top®	2698-O	350 g	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar desde pinta a pre-cosecha, con condiciones predisponentes para el desarrollo de las enfermedades. Realizar máximo tres aplicaciones por temporada, con intervalos de 7 a 10 días. Utilizar mojamiento de 1.000 a 1.200 L de agua/ha, privilegiando un buen cubrimiento de los cultivos. No aplicar Kaligreen® TOP con temperaturas superiores a 25 °C. No se recomienda aplicar Kaligreen® TOP en mezcla con otros productos fitosanitarios, debido a que se podría desarrollar incompatibilidad. Para la aplicación de otros productos debe haber un intervalo mínimo de 3 días con los tratamientos anteriores y los sucesivos.	Fungicida
	Oídio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>).				200 g	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Dosis control oídio: 3,0 kg/ha. Aplicar desde caída de pétalos a precosecha, de acuerdo con condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Mojar eficientemente todo el follaje, flores y frutos. Utilizar mojamiento de 1.500 L de agua/ha. Realizar máximo 5 aplicaciones durante la temporada, con intervalos de 7 a 10 días. No aplicar Kaligreen® TOP con temperaturas superiores a 25 °C. No se recomienda aplicar Kaligreen® TOP en mezcla con otros productos fitosanitarios, debido a que se podría desarrollar incompatibilidad. Para la aplicación de otros productos debe haber un intervalo mínimo de 3 días con los tratamientos anteriores y los sucesivos.	
			O				
	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición morena (<i>Monilia fructicola</i>)	<i>Bacillus amylolique-faciens</i> cepa MBI 600	Serifel® WP	2976-O	60 - 100 g	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Aplicar preventivamente desde floración hasta precosecha según presión de la enfermedad, repitiendo cada 7 a 10 días. Aplicaciones por temporada: realizar hasta 3 aplicaciones. Utilizar las dosis mayores en cultivos con alto desarrollo de follaje y/o cuando exista alta presión de la enfermedad. Mojamiento: aplicar con volúmenes de agua entre 1.000 y 1.500 L de agua/ha, según el desarrollo del cultivo asegurando siempre un cubrimiento óptimo del follaje. No mezclar con antibióticos ni cobres. No utilizar aguas cloradas para la aplicación.	



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de frutos	Pudrición morena (<i>Monilinia fructicola</i>), Pudrición Gris (<i>Botrytis cinerea</i>), Penicillium (<i>Penicillium</i> spp.), <i>Cladosporium</i> spp., <i>Rhizopus</i> sp., Oídio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	Bacillus subtilis cepa QST 713	Serenade® ASO	2421-O	6-8 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Para el control de Pudrición morena, Pudrición gris y Penicillium, aplique en estrategia preventiva desde pétalos expuestos (BCH59) hasta inicio de cuaja (caída de pétalos_BBCH73) ó en Pre cosecha (BBCH87). Para control de Oídio, aplique en forma preventiva desde floración (BBCH65) hasta endurecimiento del carozo (BBCH81). Utilizar volúmenes de aplicación de 1.500 a 1.800 L de agua/ha, siendo fundamental lograr un muy buen cubrimiento y distribución del cultivo a tratar. Preferir la menor de las dosis cuando las condiciones climáticas son poco favorables para el desarrollo de la enfermedad. Bajo condiciones climáticas de alta humedad relativa o lluvias de primavera, utilizar la dosis mayor. Para control de Rhizopus preferir dosis de 8 L/ha. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por temporada a intervalos de 7 días. Alternar con productos de diferente grupo químico y modo de acción.	Fungicida-bactericida
			o				
	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinérea</i> y <i>Alternaria alternata</i>)	Extracto de Citrus aurantium	Bestcure®	2986-O	1,5 - 2,0 L/ha	Virtualmente no tóxico para abejas. No requiere avisaje. Realizar 5 aplicaciones preventivas desde 20% de floración a precosecha (dosis 1,0 a 2,0 l/ha), con intervalos de 7 días o según estado fenológico. Utilizar un volumen de 1200-1500 l de agua/ha. En caso de que exista una alta presión de la enfermedad usar la dosis mayor. No aplicar con aguas duras.	
			o				
	Pudrición Gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	Extracto Quillay (Quillaja saponaria)	Botristop®	2868-O	2,0 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada, desde quiebre de color a cosecha en intervalos de 10 días o bajo condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad. Utilizar mojamiento de 1.500L de agua por hectárea.	Fungicida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Acorde a protección de producto anterior y alerta del SAG en materia de control oficial de L.botrana de tercera generación.	Polilla oriental, y Lobesia botrana	Bacillus thuringiensis*	BETK-03® WP	1780-O	50 g	Moderadamente tóxico a abejas. Requiere avisaje. 4 veces por vuelo durante la temporada, 10 días de protección en listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Completar 30 días de control o hasta fin de cosecha	Insecticida
			y/o				
	Lobesia botrana*	Virus de la poliedrosis múltiple nuclear de Mamestra brassicae	EN VIVO® SC	1.894-O	250 cc	Virtualmente no tóxico en abejas. No requiere avisaje. Sin restricciones en número de aplicaciones por temporada, 10 días de protección en listado "Plaguicidas autorizados para el control oficial de Lobesia botrana a mayo 2026". Completar 30 días de control o hasta fin de cosecha	
			+				
Desarrollo de frutos a precosecha	Pudrición gris (Botrytis cinerea)	Hypocrea virens, Bacillus licheniformis	Puelche® WP	2978-O	100-150 g	Virtualmente no tóxico en abejas. No requiere avisaje. Se recomienda aplicar Puelche® (WP) en dosis de 100 g/hl con baja presión de la enfermedad y en dosis de 150 g/hl con alta presión. Aplicar con condiciones predisponentes para la enfermedad (agua libre o síntomas de la enfermedad), desde floración en adelante. Mojamiento sugerido de 1000 l/ha, según estado fenológico y/o tamaño de plantas. Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar PUELCHÉ® (WP) con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de compatibilidad. No usar este producto junto con agua oxigenada.	Fungicida

*Plaga bajo control oficial



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Desarrollo de frutos a precosecha	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	Fenhexamid	Teldor® 500 SC	2588	1,2 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Aplicar en estadios críticos, con condiciones predisponentes favorables para el desarrollo de la enfermedad especialmente en floración y/o pre-cosecha. Se sugiere utilizar un volumen de aplicación de 1.000 a 1.500 L de agua/ha. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada cada 10 a 14 días, alternando con fungicidas de distinto grupo químico.	Fungicida
			o				
	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	Pirimetanilo	Scala® 400 SC	2339	2,0 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Dosis: 2,0 L/ha. Para el control de Botritis, aplicar desde pétalos expuestos hasta inicio de cuaja (caída de pétalos) o en precosecha. Aplique en estrategia preventiva cada 7 - 10 días. Contemplar no más de dos aplicaciones durante la temporada. Considerar volumen de 1.500 L de agua/ha, privilegiando un buen cubrimiento de la superficie a tratar.	
			+				
	Estados móviles de arañas roja europea (<i>Panonychus ulmi</i>) Primavera-verano	Aceite Parafínico	Pure Spray 22E	1791	0,7 L	Muy tóxico a abejas. Requiere avisaje. Para estados móviles de arañas aplicar cuando se detecten los primeros ejemplares. Para este tratamiento: 1 aplicación. Mojamiento sugerido: carozos 2000 L/ha. Evitar aplicaciones con temperaturas superiores a 28°C y en plantas sometidas a un alto nivel de estrés hídrico. No aplicar con riesgo de helada o inmediatamente después de esta	Insecticida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Postcosecha	Chanchitos blancos-Escama de San José (<i>Diaspidiotus perniciosus</i>),	diazinon	Diazol® 50 EW	1591	100 cc/100L	Muy tóxico a abejas. Requiere avisaje. Para control de escama de San José y chanchito blanco, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de larvas o ninfas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días, utilizando un volumen de aplicación de 2.000 L de agua/ha. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión de plagas	Insecticida
	Arañita Roja Europea y arañita bimaclada	Acequinocilo	Kanemite® 15 SC	1631	60-90 cc	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Mínimo 1,2 Lt/ha. Usar alto volumen de mojamiento. Uso al detectar primeros ejemplares juveniles.	Acaricida
			o				
		Espirodiclofeno	Envidor® 240 SC	1713	0,75-1 L/ha	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. En caso de presencia, aplicar después de cosecha si no se usó espiroclifeno durante la temporada. En caso de haber empleado este i. activo, escoger otra opción. Uso al detectar primeros ejemplares juveniles.	
			o				



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Postcosecha	Arañita Roja Europea y arañita bimaclada	Fenazaquina	Magister® 20 SC	1786	50 cc	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Acaricida del Grupo METI (Escoger uno de ellos si se requiere poder de volteo, independiente el estado de desarrollo (móviles).	Acaricida-insecticida-fungicida
			o				
		Piridaben	Sanmite ® WP	1380	75 g	Moderadamente tóxico a abejas. Requiere avisaje. Acaricida del Grupo METI Grupo METI (Escoger uno de ellos si se requiere poder de volteo, independiente el estado de desarrollo (móviles). NO MEZCLAR CON FORMULACIONES EN BASE A ACEITE.	Acaricida
			o				
		Fenpiroximato	Acaban® 050 SC	1447	50 cc	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Acaricida del Grupo METI (Escoger uno de ellos si se requiere poder de volteo, independiente el estado de desarrollo (móviles).	Acaricida



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Caída de hojas	Cáncer bacterial (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	<i>Bacillus subtilis</i> Cepa Antumávida / <i>Bacillus subtilis</i> Cepa Vilcún / <i>Bacillus licheniformis</i> Cepa Mallerauco / <i>Brevibacillus brevis</i> Cepa Maguellines / <i>Brevibacillus brevis</i> Cepa Maguellines I	Nacillus®	2678-O	100 g	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Cepas bacterianas adaptadas a condiciones de bajas temperaturas. Vol. de agua recomendado para periodo de receso (BBCH 97 a BBCH 00): 1.000-1,500 L/ha. Nacillus® puede reemplazar aplicaciones de cobre invernales, de caída de hoja e inmediatamente postcosecha (control de cáncer bacterial). No aplicar en mezcla con cobres ni antibióticos, como tampoco inmediatamente de realizados estos tratamientos. No aplicar en presencia de residuos de polisulfuro de calcio (polisulfuro es altamente tóxico para los trabajadores y la microbiota benéfica del huerto).	Bactericida
			o				Fungicida
	Plateado (<i>Chondostereum purpureum</i>); Chancro (<i>Cytospora chrysosperma</i>) Inóculo: Pudrición negra del cerezo (<i>Alternaria alternata</i>); Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	<i>Bionectria ochroleuca</i> , <i>Trichoderma gamsii</i> , <i>Hypocrea virens</i>	Mamull®	2964	100 g	Virtualmente no tóxico a abejas. No requiere avisaje. Para tratamiento de cortes de poda o heridas , asperjar utilizando Vol. Agua/ha: 500-1.000 L, según tamaño de planta. Consultar a Bionativa/SummitAgro por compatibilidades con macro y micronutrientes en mezcla al estanque. Para tratamiento de hojarasca , se recomienda una concentración de 100 g/hL en 400 L/ha de agua (desde caída de hojas hasta floración)	
			o				



Estado Fenológico	Plaga o Enfermedad (comprendida en etiqueta de uso)	Ingrediente Activo	Producto Comercial Referencial (Color de celda según categoría toxicológica)	N° autorización SAG	Dosis ml-gr/100 L (aplicación terrestre)	Observaciones (Incluye categoría vigente de clasificación por toxicología de abejas)	Tipo pesticida
Caída de hojas	Cáncer Bacteriano (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i>)	<i>Bacillus subtilis</i> cepa QST 713	Serenade® ASO	2421-O	8 L/ha	En proceso de actualización de etiqueta en relación con clasificación toxicológica a abejas. Realizar tratamientos preventivos, según condiciones predisponentes durante el periodo de caída de hojas (BBCH93), inicio de brotación (BBCH07) y floración (BBCH61) o cuando exista presión de la enfermedad. Aplicar con volúmenes de aplicación de 1.000 a 1.500 L de agua/ha, de acuerdo al desarrollo del cultivo, asegurando un buen cubrimiento y distribución del caldo de aspersión. Para lograr mejores resultados, se sugiere mezclar y/o alternar con productos a base de cobre. Realizar un máximo de 4 aplicaciones por temporada, con un intervalo de 7 días.	Bactericida Fungicida

